

## Etapes du diagnostic d'un cheptel

1) **Compter** nombre de vaches parées, nombre de paires de pieds en relation avec le nombre de vaches de l'élevage

2) Pour chaque lésion identifiée et degré de gravité, compter le nombre de vaches

Si une vache a 2 fois une même lésion, seule la lésion de degré le plus grave est comptabilisée

3>2>1

M2>M1>M3>M4

3) **Identifier les pathologies présentes sur l'élevage à l'aide des lésions caractéristiques:**

Les pathologies infectieuses :

- Panaris, s'il y a des lésions de panaris
- Fourchet, s'il y a des lésions d'érosion de talon
- Maladie de Mortellaro, s'il y a des lésions de dermatite digitée
- (Nécrose, s'il y a des lésions de nécrose)

Les pathologies non infectieuses :

- Fourbure chronique, s'il y a de la concavité cerclage
- Fourbure subaiguë s'il y a des ouvertures de ligne blanche, des bleimes diffuses de niveau 2-3, des seimes cerclées sur les 2 ou 4 onglons.

Les abcès de pieds ne sont pas dus à une pathologie mais à des facteurs extérieurs.

4) Hiérarchiser les pathologies

Identifier les vaches présentant des **lésions qui font boiter**

Attribuer ses lésions à une ou des pathologies (principalement pour les ulcères et cerises)

**Compter le nombre de vaches** boiteuses à cause de chaque pathologie.

Déterminer la ou les pathologies dominantes (c'est-à-dire celles qui font le plus boiter).

